

INPORO Mykorhizní houby je rostlinný biostimulant určený k vytvoření mykorhizní symbiózy mezi kořeny pěstovaných rostlin a prospěšnými půdními houbami r. *Glomus*. Vytvořená mykorhiza umožňuje lepší příjem vody a živin (zejména fosforu a draslíku) a jejich efektivnější dodání rostlinám.

INPORO Mykorhizní houby obsahuje vybrané rody arbuskulárních mykorhizních hub, inertní nosič a podpůrné složky, které zajišťují dobrý rozvoj symbiózy a růst rostliny do doby, než se vytvoří funkční síť mykorhizního mycelia v půdě.

Rozsah a způsob použití:

INPORO Mykorhizní houby je vhodný pro:

- papriky, rajčata, okurky, dýně, melouny, lilky, mochně, luskoviny jako fazole, hrách, sója, atd.
- většinu kvetoucích rostlin (růže, petúnie, muškáty, aj.), popínavé rostliny, pokojové rostliny
- ovocné stromy, olivovníky a palmy
- většinu okrasných jehličnanů, např. tuje, tis, cypřiš, jalovec, cypřišek, tisovec, araukária, jinan
- některé listnaté stromy a keře, např. javor, jasan, jeřáb, olše, svída
- zakládání trávníku, sportovních hřišť
- pro aplikace v zahradách, školkách, atd.

INPORO Mykorhizní houby je nevhodný pro:

- orchideje
- čeleď brukvovité (Brassicaceae), např. brokolice, květák, zelí, kapusta
- čeleď merlíkovité (Chenopodiaceae), laskavcovité (Amaranthaceae), hvozdíkovité (Caryophyllaceae), šáchorovité
- jehličnaté stromy (borovice, smrk, jedle a další) a některé listnaté stromy jako je dub buk nebo bříza
- vřesovcovité rostliny (rododendrony, azalky, vřesy, atd.)

Chemické a mikrobiologické vlastnosti:

Vlastnost:	Hodnota:
Vlhkost v % max.	15,0
Min. počet spor arbuskulárních mykorhizních hub na g	50

Obsah rizikových prvků splňuje limity platné v ČR.

Aplikace a dávkování:

Přípravek musí přijít do kontaktu s kořeny rostlin. Dávkujte 15 g na rostlinu. Výrobek nasypejte na dno výsadbové jamky, zapravte do substrátu a vysaďte rostlinu. Ošetření vzrostlých rostlin se provádí vyhloubením 2-4 děr okolo rostliny, do kterých se aplikuje 30 až 45 g přípravku na rostlinu. Plošná aplikace spočívá v zapravení přípravku 3 cm pod povrch před setím, v dávce 150 g/m². Přípravek se může smíchat se substrátem v poměru 1,5:100. Není možné rostlinu předávkovat - vyšší dávka zajistí lepší rozvoj mykorhizy.

Upozornění:

Vyvarujte se použití systemických fungicidů v průběhu prvních tří týdnů po aplikaci. Nadměrná závlaha a přehnojování, zejména superfosfátem, omezuje účinnost přípravku.

Výrobek je povolen pro použití v ekologické produkci v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.



www.agrobio.cz

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Je třeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Při práci nejzte, nepijte, nekuřte. Používejte ochranné rukavice. Po skončení práce vždy ruce pečlivě omyjte vodou a mýdlem a kůži ošetřete reparačním krémem.

První pomoc: Při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody. Při náhodném požití ihned kontaktujte lékaře. Při potřísnění pokožky omýt vodou a mýdlem. Při vážnějších případech, zejména při alergických reakcích, vyhledejte lékařskou pomoc.

Podmínky skladování: Skladujte v suchu a chladu. Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin a krmiv.

Likvidace obalů a zbytků: Prázdné obaly doporučujeme předat do sběru k recyklaci nebo spálit ve schválené spalovně. Zbytky preparátu je možno použít do zahradnických kompostů.

Doba použitelnosti: Za dodržení podmínek skladování je přípravek použitelný po dobu 2 let od data výroby.

Výrobek je dodáván balený.

Hmotnost balení: 1 kg ±3%