

Přípravek ve formě suspenze emulze.

Balení pro NEPROFESIONÁLNÍ uživatele. Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Název a množství účinné látky:

amisulbrom 240 g/L (cca 23,08 % hm.)

oxathiapiprolin 48 g/L (cca 4,62 % hm.)

Použití a dávkování:

Plíseň bramborová na bramborách
vdávce 2,5 ml/5 l vody/100 m².

Postříkáním od fáze 1, bazálního postranního výhonu až do konce zrání. **Ochranná lhůta je 7 dní.** Přípravek se aplikuje preventivně před objevením se prvních příznaků choroby. Při aplikaci se snažte co nejlépe pokrýt listovou plochu.



Další označení přípravku: SP1 Úplné znění této věty je uvedeno v přiloženém návodu k použití.

H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P201 Před použitím si obzvláště pečlivě přečtěte speciální instrukce. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P308+P313 Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P391 Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu, EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

