

Přípravek ve formě suspo emulze.

Balení pro NEPROFESIONÁLNÍ uživatele.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Název a množství účinné látky:

oxathiapiprolin 40 g/l (cca 3,71 % hm.),

zoxamid 300 g/l (cca 27,78 % hm.)

Použití a dávkování:

Réva – plíseň réвовá.

Dávka 5 ml /10 l vody. Postřikem nebo rosením od 5 pravých listů do konce uzavírání hroznů, max. 2x za rok. Interval mezi aplikacemi je 10 dnů. OL je 28 dnů. Nepoužívejte přípravek pro ošetření révy ve školkách.



Další označení přípravku: SP1 Úplné znění této věty je uvedeno v přiloženém návodu k použití.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302 + P352 Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. P391 Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

